

# REABILITAÇÃO ORAL COM PRÓTESE PROVISÓRIA IMEDIATA: RELATO DE CASO CLÍNICO

**Jordana Medeiros Lira Decker (Estudante de pós graduação de odontogeriatria- ABO) Priscila Rejane dos Santos Silva, (Estudante de pós graduação de odontogeriatria- ABO), Poliana de Oliveira França (Estudante de pós graduação de odontogeriatria- ABO) Maria Raquel Crispim paschoal da Fonseca (Estudante de pós graduação de odontogeriatria- ABO) Cariles Silva de Oliveira (Orientadora)**

**Email: jordana\_medeiros@hotmail.com, pricilarejaness@gmail.com, polianafranca.odonto@gmail.com, mraquelcp@yahoo.com.br, carilessol2008@hotmail.com**

## 1. INTRODUÇÃO

A prótese total imediata (PTI) instalada imediatamente após a extração dos dentes naturais proporciona ao paciente estética e função, o restabelecimento de inúmeras funções como a mastigatória, as funções musculares e a estética, evitando assim transtornos sociais e psicológicos pela ausência dos dentes.<sup>1</sup> A perda dos dentes modifica as funções do sistema estomatognático, contribuindo para variações na dieta, no caso da função mastigatória, forçando a uma nova prática alimentar, com um consumo maior de alimentos macios e fáceis de mastigar, sendo esse novo hábito, causador de restrições de certos alimentos e comprometedor do estado nutricional do paciente.<sup>3</sup> Com a intenção de recuperação da condição de saúde do sistema estomatognático, da autoestima e do bem-estar do paciente, levando a uma melhora na qualidade de vida, a prótese total imediata viabiliza a reabilitação oral, consistindo nas etapas realizadas previamente à extração dos dentes remanescentes, com o objetivo de restabelecer a função e estética, após a exodontia destes elementos dentários, proporcionando qualidade de vida a esses pacientes

## 2. RELATO DO CASO CLÍNICO

Paciente M.C.A., gênero feminino, 62 anos, compareceu à ao curso de pós graduação de odontogeriatria da ABO, queixando-se da aparência do seu sorriso, afirmando que “ sua prótese fixa estava com mobilidade”. Após anamnese verificou-se que a paciente possuía boa saúde geral e necessidades funcionais e estéticas imediatas.

Ao exame clínico e radiográfico, observou-se a presença de cálculos dentários, perda óssea acentuada em volta das raízes dos dentes com mobilidade acentuada, além de ausências dentárias ( do elemento 14 ao elemento 28 ) do sentido da direita para esquerda (Figura 1).



Após leitura e explicação do plano de tratamento e posterior assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) pela paciente, o tratamento constituiu-se em exodontia dos elementos 15 e 17 e remoção da prótese fixa onde o procedimento cirúrgico consistiu em exodontia dos elementos comprometidos e alveolotomia, prosseguindo-se à hemostasia e sutura. A prótese total superior foi confeccionada e instalada na consulta seguinte da paciente, a qual foi instruída a não removê-la por 24 horas (Figura 2). Proseguiram-se as consultas para acompanhamento do processo cicatricial e adaptação à reabilitação através de ajustes.

## 3. DISCUSSÃO

A qualidade de vida e a interação do paciente na sociedade estão intimamente ligadas a autoestima. Autores<sup>1,2,3</sup> corroboram e relatam vantagens e desvantagens da instalação de próteses imediatas, são evidentes e devem ser apresentadas ao paciente previamente ao início do tratamento; ressaltando que o prognóstico de casos de reabilitação com próteses imediatas costuma ser duvidoso, uma vez que o resultado final não é totalmente previsível, porém em inúmeros casos as funções e expectativas dos pacientes são atingidas como no caso clínico aqui relatado.

## 6. CONCLUSÃO

A reabilitação com PTI servindo como PT superior definitiva é uma excelente escolha para pacientes edêntulos. Essa modalidade de tratamento proporcionou uma reabsorção lenta, ordenada e auxiliou a paciente a aceitar uma nova condição oral

## 5. REFERÊNCIAS

Mônica Oliveira Carrijo, Ubiratan Goncalves Junior, C. A. C. S. F. W. da C. G., & Gabriela Leal Peres, Samuel Lucas Fernandes, F. J. A. A. S. N. (2018). Reabilitação oral com prótese provisória imediata. ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION.

Goiato MC, Santos DM, Medeiros RA, Sônego MV. Técnicas de confecção de prótese total imediata mucossuportada. Revista Odontológica de Araçatuba 2014;35(1):67-72..

Sugio CYC, Gomes ACG, Maciel JG, Procópio ALF, Neppelenbroek KH. Considerações sobre os tipos de próteses parciais removíveis e seu impacto na qualidade de vida. Revista Odontológica de Araçatuba 2019;