

AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS COM DEPRESSÃO: PROPOSTA DE HISTÓRICO DE ENFERMAGEM.

AUTOR: SANTOS JSR¹

1. Enfermeira gerente do ambulatório do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco – PROCAPE. Mestra em Gerontologia, Universidade Federal da Paraíba/ UFPB. João Pessoa (PB). Doutoranda no Programa de Pós- Graduação em Enfermagem UPE/UEPB.

RESUMO

OBJETIVO: Descrever necessidades de saúde de idosos institucionalizados com depressão subsidiados no modelo teórico das Necessidades Humanas Básicas

MÉTODO: Revisão integrativa da literatura, que compartilha a construção de um instrumento, buscando compreender as necessidades de saúde de idosos institucionalizados com depressão, utilizando o modelo teórico das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta.

RESULTADO: foram identificaram 88 indicadores empíricos relacionados à depressão em idosos institucionalizados classificados segundo as Necessidades Humanas Básicas de Horta. Para confirmação da utilidade desses indicadores, na prática profissional, realizaram-se entrevistas com enfermeiros, buscando-se compreender quais indicadores seriam relevantes para avaliação das necessidades de saúde de idosos institucionalizados com depressão. Constata-se que as necessidades Psicossociais apresentaram 53% de indicadores, por se tratar de uma carência maior nas dimensões sobre o amor e aceitação. As necessidades psicobiológicas mostram 30% de frequência de indicadores, influenciam no estado de saúde do idoso institucionalizado com depressão, exigindo cuidados de enfermagem específicos para cada situação e as necessidades psicoespirituais apresentaram 17% de indicadores, sendo necessidades que revelam a capacidade do agir e do pensar na pessoa idosa depressiva, de maneira reflexiva e singular.

CONCLUSÃO: Entende-se, portanto, que o enfermeiro precisa estar atento às manifestações apresentadas no envelhecimento no que diz respeito à depressão em idosos institucionalizados, buscando compreender as condições de vida e as necessidades humanas básicas de idosos institucionalizados com depressão.

