

## **SITUAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS CASOS DE TUBERCULOSE DA 9ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA**

Ítalo Franklin Barbosa Alencar e Silva- FSM- italofranklin@live.com.pt

Ednan Cardoso de Sousa- FSM- ednanelit@hotmail.com

Karoline Dantas de Souza Torquato- FSM- karoline.torquato@hotmail.com

Talina Carla da Silva – FSM – talinacarla@hotmail.com

Sheylla Nadjane Batista Lacerda- FSM- SheyllaBatista@bol.com.br

**Introdução:** A tuberculose (TB) é uma doença caracterizada clinicamente como sendo infectocontagiosa causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, transmitida de forma direta através de gotículas contendo os bacilos, estes são liberados através da tosse, fala ou espirro. O tratamento básico da TB é realizado por seis meses, por isso, chamada de “curta duração”, gratuito e de competência dos serviços públicos de saúde. O encerramento deste tratamento pode ser classificado em “sucesso”, ou “insucesso”. É considerada uma emergência mundial, devido sua magnitude epidemiológica, cerca de um terço da população esta infectada, o que equivale a 100 milhões de pessoas por ano, dos quais oito milhões estão doentes. No Brasil, a doença atingiu 71.230 pessoas no ano de 2012, o que corresponde a uma incidência de 36,7/100.000 habitantes, mantendo-o na 17ª posição entre os países com alta carga da doença. Neste mesmo ano, o estado do Paraíba obteve 1.433 casos, destes 32, equivalente a uma incidência de 6,5/100.000, foram registrados nos 15 municípios que compõem a 9ª Gerência Regional de Saúde da Paraíba situada em Cajazeiras. **Objetivo:** Investigar a situação de encerramento dos casos de Tuberculose dos municípios pertencente à 9ª Gerência Regional de Saúde da Paraíba, no ano 2012. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo. Teve como população 32 casos de tuberculose notificados no SINAN no ano de 2012. Realizado nos municípios que compõem a 9ª Gerência Regional de Saúde da Paraíba, situada na cidade de Cajazeiras-PB. Teve como variáveis do estudo: cura, abandono, transferência, óbito por tuberculose, óbito por outras causas, transferência, mudança de diagnóstico, tuberculose multirresistente e em branco. Para obtenção dos dados utilizou-se o SINAN-NET. Para análise foi realizada técnica estatística descritiva obtendo-se a frequência absoluta e relativa,

utilizando o programa SPSS 18. **Resultados:** No ano de 2012, 32 casos de Tuberculose foram notificados na 9ª Gerência Regional de Saúde da Paraíba, abrangendo um total de 15 cidades paraibanas. Em relação a situações de encerramento dos casos de tuberculose em 2012, a porcentagem de cura foi de 65,6%; de abandono 3,2%; transferência 3,2% e em branco 28,1%. **Conclusão:** Identificou-se que os municípios que compõem a 9ª Gerência Regional de Saúde da Paraíba, não alcançaram a meta de cura preconizada pela organização mundial de saúde que é de no mínimo 85%, entretanto, a meta de abandono de no máximo 5% foi alcançada, apesar da subnotificação, visto que os dados em branco foram elevados. Diante disso, recomenda-se que sejam elaboradas medidas para fortalecer o tratamento diretamente observado e melhoria no preenchimento dos dados no sistema de informações dos sistemas em saúde.

**Palavras-Chave:** Tuberculose, Saúde Pública, Transmissão de doenças.